1. Mujer de 38 años con diagnóstico de infección de vías urinarias, refiere ardor a la micción, urgencia nicturia y dolor agudo en la región dorsal. En este caso ¿Cuál es la intervención de enfermería para el alivio del dolor?

a) Realizar sondaje vesical.

b) Aplicar calor en el perineo

c) Educar a la paciente a limpiar el perineo y el meato uretral de atrás hacia delante.

d) Aplicar frío en el perineo.

2. Al servicio de vacunas llega una madre con un niño de 5 años, por primera vez a vacunarle la madre refiere que no lo pudo traer a los por estar enfermo y luego se olvidó. Seleccione las vacunas se debe aplicar según el esquema de inmunizaciones que exige la Estrategia Nacional de Inmunizaciones del Ecuador:

1) Admistrar la 1 dosis de fIPV.

2) Admistrar la 2 dosis de fIPV.

3) Admistrar la 1 dosis de bOPV.

4) Admistrar la 2 dosis de bOPV.

3. Indíquela altura de la teoría de enfermería que tiene como objetivo proporcionar al paciente el mejor entorno posible para que las fuerzas de la naturaleza permitan la curación o el mantenimiento de la salud.

a) Teoría de Henderson

b) Teoría de Betty Neuman.

c) Teoría de Nightingale.

d) Teoría de Calista Roy

4. El sulfato de magnesio tiene una presentación: ampolla de 10ml al 20% ¿Cuál es la con centración en gramos de la ampolla?

a) 1gr

b) 2gr

c) 3gr

d) 4gr

CONFIDENCIAL

5. ¿Cuál es la dosis de impregnación de sulfato de magnesio en emclasia para prevenir convulsiones?

a) 1 g intravenosa en 60 minutos

b) 6 g intravenosa en 20 minutos

c) 4 g intravenosa en 60 minutos

d) 4 g intravenosa en 20 minutos

6. Selecciones las vacunas que aplica tanto a los adolescentes como adultos que presentan infección por VIH con valores de linfocitos CD4+ por debajo de 200 células por ml

1. Influenza inactiva

2. Difteria tétanos

3. Fiebre amarilla

4. Antineumocócica

5. Papiloma virus

6. Varicela Zoster

a) 1, 4, 5, 6

b) 1, 3, 5, 6

c) 1, 2, 3, 5

d) 1, 2, 4, 5

7. Al aplicar enemas de limpieza con el objetivo de eliminar las heces, se emplean varias soluciones ¿Qué tipo de soluciones estimula el peristaltismo aumentando el volumen en el colon e irritando la mucosa?

a) Hipotónica

b) Hipertónica

c) Isotónica

d) Espuma

CONFIDENCIAL

8. La herramienta metodológica que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud enfermedad de una población, se refiere a:

a) Casa abierta

b) Feria de salud

c) Mapa parlante

d) Sala situacional

9. Paciente masculino de 58 años de edad con antecedentes de infarto agudo de miocardio hace días, el cual va a ser intervenido de apendicitis aguda según la Marican Society of Anasthesiologists (ASA) ¿Cuál es la clasificación que le corresponde a este paciente?

a) ASA 1

b) ASA 2

c) ASA 3

d) ASA 4

10. usted va a realzar una vía periférica heparinesada en n paciente de 54 años. ¿cuál de los siguientes cuidados de enfermería debe aplicar en este caso?

a) Ocluir fuertemente con un parche al sitio de punción

b) Presionar fuerte al menos durante 5 min, observando si hay signos de hemorragia

c) Retirar la aguja lentamente sin tocar la piel circundante a la zona de punción para evitar dolor

d) Poner compresa de agua tibia para evitar edemas

11. Para calentar a un recién nacido hipotérmico, se debe ajustar a la temperatura de la incubadora por encima de la temperatura axial del RN, en un máximo de:

a) 1.5ºC

b) 1ºC

c) 2ºC

d) 2.5ºC

CONFIDENCIAL

12. Entre responsabilidades en el centro de salud está realizar la toma de una muestra para tamizaje metabólico neonatal ¿al atender a prematuros de menos de 35 semanas de edad gestacional, en qué momento debe realizarte la toma de muestra?

a)) A partir de los 4 día (96 horas)

b) A los 5 días (120horas)

c) A los 6 días (144horas)

d) Al séptimo día (168 horas)

13. Para la administración de medicamentos por vía intradérmica, el ángulo de inserción de la aguja con respecto a la piel es de:

a) 10º

b) 15º

c) 25º

d) 45º

14. Paciente con pre inscripción de oxigenoterapia a 3 litros por minutos

¿Cuál dispositivo para la administración de oxígeno utiliza?

a) Mascarilla simple

b) Mascarilla de reciclamiento parcial

c) Cánula nasal o Bigotera

d) Tubo en T

15. Paciente de 65años que presenta en los últimos meses intolerancia ala frio está más estreñido que lo habitual y se encuentra muy cansado. En la exploración fisca llama la atención la presencia de edema palpebral y una lengua muy grande (mocogrosa), su presión arterial es de 120/60 mmhg y su frecuencia cardiaca: 50 lat/ min. En un Rx de torax se observa cardiomegalia y signos de derrame pericárdico. Considerando estos datos ¿Cuál es el diagnostico probable?

a) Enfermedad de Addison

b) Hipoparatiroidismos

c) Hipotiroidismo

d) Hipertiroideos

CONFIDENCIAL

16. Los enemas de limpieza tienen como objetivo eliminar las heces, para lo cual se usa varias soluciones ¿Qué tipo de solución actúa mediante la extracción del líquido del espacio intersticial hacia el colon?

a. Hipotónica

b. **Hipertónica**

c. Isotónica

d. Espuma

17. Paciente con diagnóstico de Cetoacidosis Diabética. Al realizar la valoración de enfermería, usted observa una respiración rápida, profunda y laboriosa. ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios es el descrito en este caso?

a) Respiración de Biot.

b) Respiración de Kussmaul

c) Respiración Eupnéica**.**

d) Respiración de Cheyne-Stokes.

18. Como enfermera circulante, usted atiende en quirófano a un paciente al que se realiza una colostomía. Una vez que se realizó la apertura de la pared abdominal, el cirujano indica que cambie al paciente de posición para tener un mejor acceso a la vesícula biliar ¿En que posición usted coloca la paciente?

a) Decúbito dorsal

b) Trendeleburg

c) Litotomia

d) Trendeleburg invertida

19. El enunciado "caso sospechoso que además tiene relación epidemiológica, sin evidencia definitiva de laboratorio" corresponde a:

a) Caso sospechoso

b) Caso probable

c) Caso confirmado

d) Caso descartado

CONFIDENCIAL

20. paciente que permanece en el servicio de ginecología con diagnóstico de eclampsia bajo el tratamiento de sulfato de magnesio, a la valoración de enfermería se observa alteraciones en la frecuencia respiratoria, taquicardia y disminución de la diuresis. Usted asume que esta afrente a una intoxicación por el medicamento administrado. ¿Cuáles son los cuidado de enfermera prioritario de acudo al caso?

a) Preparar el área para la reanimación cardiaca y control de electrolito

b) Monitorizar signos vitales y preparar solución salina para administrar el antídoto

c) Administrar oxigenoterapia y preparar gluconato de calcio 1gramo

d) Administrar el antídoto en bolo y monitorizar la frecuencia respiratoria

21. Como profesional de enfermería de un servo hospitalario, al valorar la función respiratoria de un paciente de 43 años usted observas que las respiraciones anormalmente poco profunda en dos a tres respiraciones seguida de un periodo irregular de apnea ¿Cómo reportar esta alteración del patrón resriptorio en su informe?

a) Respiración de Biot.

b) Respiración de Kussmaul

c) Hipoventilación

d) Respiración de Cheyne-Stokes.

22. Al valorar a un paciente que se encuentra en la etapa final de la vida, usted encuentra como hallazgo que el paciente tiene disminución de la actividad del tubo digestivo. Con nauseas, acumulación de gases, distención abdominal y retención de heces. Seleccione el cambio característico indicativo de muerte clínica inminente que corresponde a estas manifestaciones clínicas.

a) Cambios de las respiraciones

b) Aumento de la densidad ósea.

c) Pérdida del tono muscular

d) Pérdida de la densidad ósea.

23. En la auscultación abdominal usted detecta ruidos hipoactivos muy suaves ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser la causa de esta manifestación clínica?

a) Uso de laxantes

b) Manipulación de intestinos durante la cirugía

c) Intolerancia a los alimentos.

CONFIDENCIAL

d) Gases abdominales

24. Paciente de 78 años ingresado por neoplasia de pulmón en estadio final, se encuentra estuporoso, con oxígeno suplementario a 3 litros por minutos por bigotera. Los signos vitales muestran los siguientes datos TA: 50/40 mmHg, temperatura 37.2 ºC respiración 32 rpm y saturación de oxigeno sin lectura en el oxímetro de pulso. ¿Cuál es la causa por la cual el oxímetro de pulso no registra la lectura de saturación?

a) Alteración de la frecuencia cardiaca

b) Alteración de la frecuencia respiratoria

c) Hipertensión arterial

d) Hipotensión arterial

25. Desacuerdo a la guía de salud de adolecentes la atención de calidad que hace referencia a no minimizar solamente al momento de la consulta si no aumenta la responsabilidad por la persona hasta que reduzca soluciones el ´problema de salud corresponde a la siguiente característica

a) Continua

b) Integrada

c) Longitudinal

d) Participativa

26. Al tomar los signos vitales como parte de la valoración de enfermería, usted se percata en la curva térmica que el valor de la temperatura del paciente ha estado con grandes oscilados durante el día, en ocasiones, desciende a valores de hasta 36.7 ºC para luego ascender nuevamente hasta 38.5ºC. Según la forma de patrón febril ¿Qué tipo de fiebre tiene el paciente?

a) Fiebre remitente

b) Fiebre continúa

c) Fiebre intermitente

d) Fiebre recurrente

CONFIDENCIAL

27. Una señora acude al centro de salud con su hijo de 7m y 3dias de edad por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.4 ºC; frecuencia cardiaca120/min; presión arterial 90/62mmhg; frecuencia respiratoria 40/min: al observar el carnet de vacunación verifica que tiene distraídas las sigueteas vacunas: pentavalente 3 dosis, polio oral 3 dosis, neumococo 3 dosis y rotavirus 1 dosis adiestrada a los 2 meses 10 días ¿Qué decisión debe tomar la enfermara con respecto a la administración de la vacuna rotavirus?

a) Suspender la administración porque es suficiente con una dosis

b) Reiniciar el esquema de vacunación con la primera dosis, y la segunda a las 2 semanas

c) Debe administrar la segunda dosis de rotavirus debido a su edad

d) Al administrar rotavirus a esta edad podría causar invaginación intestinal

28. El profesional den enfermero/ra ha realizado una prueba cuantitativa en la cual debe probar la hipótesis de la prueba estadística: la prueba que sirve para grupos diferentes entre sí de manera significativas sus medidas a una variable corresponde a:

a) Correlación de Pearson

b) Regresión lineal

c) Prueba t

d) ANOVA

29. La adecuada implementación de las maniobras de RCP por el personal de enfermería es esencial para lograr la supervivencia del paciente en paro cardiaco. ¿Cuáles son las características de las compresiones torácicas de alta calidad en un adulto?

a) Frecuencia de 100 - 120 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible

b) Frecuencia de 100 - 120 cpm, 2 cm de profundidad como mínimo, evitar la expansibilidad torácica entre las compresiones e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.

c) Frecuencia de 60 -100 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible

d) Frecuencia de 80 -100 cpm, 2.5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.

CONFIDENCIAL

30. Luego de haber sido reconstituidas las vacunas SRP multidosis, SR, BCG y Antiamarílica pueden continuar utilizándose por un período máximo de:

a) 2 horas y descartar.

b) 8 horas y descartar.

c) 6 horas y descartar.

d) 12 horas y descartar.

31. Como enfermera, usted atiende en quirófano a un paciente al que se realiza una Craneotomía. Una vez que se realizó la cirugía, el cirujano indica que cambie al paciente de posición para tener un mejor la circulación ¿En qué posición usted coloca la paciente?

a) Decúbito dorsal

b) **Trendeleburg**

c) Litotomia

d) Trendeleburg invertida

32. Usted como enfermero/ra en cargado del área de enic tiene que tener en cuenta la temperatura de las vacunas. De acuerdo a la cadena de frio a qué vacunas son sensibles a las temperaturas bajas?

a) SRP, SR, IPV. bOPV , meningococo, influenza, varicela, componente que contenga haemophilus**,** influenzae, (pentavalente hexavalente), rotavirus, HPV, tifoidea, BCG y FA

b) bOPV, varicela, influenza, IPV, SRP, DPwT, DPaT, pentavalente, hexavalente, SR, rotavirus, fiebre amarilla, BCG, DT y dt

c) DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, neumococo, DT, dt, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus

d) DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, neumococo, SR, rotavirus, fiebre amarilla, BCG, DT y dt

33. Al servicio de vacunas llega una madre con un niño de 11 meses, a vacunarle. Con antecedentes de implante de órganos a los dos meses de edad, con estos accedente; para seguir el esquema nacional de vacunación ¿Qué vacunas se deben administrar?

a) Sarampión, Rubeola y Parotiditis (paperas), 1º dosis.

b) Pentavalente y bOPV 3 º dosis, Neumococo 1 ºdosis.

c) Pentavalente y IPV 2 º dosis, Neumococo 2 ºdosis.

d) Rotavirus, Sarampión Y SRP 1º dosis

CONFIDENCIAL

34. Después de la post consulta usted está presentando una charla educativa sobre estimulación temprana: indica al cuidador que dé al niño juguetes fáciles de ser manejados para que pueda pasarle de una mano a otra (motor fino adoptivo) ¿a qué grupo se refiere a la guía de estimulación temprana?

a) Niños de 18 a 23 meses

b) Niños de 9 a 11 meses

c) Niños de 4 a 5 meses

d) **Niños de 6 a 8 meses**

35. Usted como enfermero/ra en cargado del área de vacunación tiene que tener en cuenta la temperatura de las vacunas. De acuerdo a la cadena de frio a qué vacunas son sensibles a las temperaturas Altas?

a) SRP, SR, IPV. bOPV , meningococo, influenza, varicela, componente que contenga haemophilus, influenzae, (pentavalente hexavalente), rotavirus, HPV, tifoidea, BCG y FA

b) bOPV, varicela, influenza, IPV, SRP, DPwT, DPaT, pentavalente, hexavalente, SR, rotavirus, fiebre amarilla, BCG, DT y dt

c) DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, neumococo, DT, dt, influenza, IPV, tifoidea y rotavirus

d) DPaT, hexavalente, DPwT, pentavalente, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, neumococo, SR, rotavirus, fiebre amarilla, BCG, DT y dt

36. Después de la post consulta usted está presentando una charla educativa sobre estimulación temprana: indica al cuidador que dé al niño Enseñarle palabras simples a través de rimas, músicas y sonidos comúnmente hablados (palabras completas), ¿a qué grupo se refiere a la guía de estimulación temprana?

a) Niños de 9 a 11 meses

b) Niños de 12 a 14 meses

c) Niños de 15 a 17 meses

d) Niños de 18 a 23 meses

CONFIDENCIAL

37. Una escolar femenina de 9 años, llega al servicio de vacuna, la madre refiere tratamiento por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que solo le aplicó las vacunas hasta un 1 año de edad. Señale la vacuna que se debe aplicar según el esquema del MSP del Ecuador.

Seleccione una:

a). Dpt.

b). Hepatitis B.

c). Trivalente viral.

d). Papiloma virus (VPH)

38. Usted como personal de enfermería debe realzar el lavado de manos acuerdo con el manual de bioseguridad se establece 5 momentos para el lavado de manos con su fundamentación científica:

1. Antes del contacto directo con el paciente.	**a) Por qué:** para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	**b) Por qué:** para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
3. Después de exposición a fluidos corporales	**c) Por qué:** para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la subsiguiente propagación potencial.
4. Después del contacto con el paciente	**d) Por qué:** para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente Por	**e) Por qué:** para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización y, en algunos casos, de las infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de los

a) 1a, 2d, 3c, 4b, 5e

b) 1a, 2c, 3e, 4b, 5d

c) 1e, 2d, 3c, 4b, 5a

d) 1e, 2a, 3b, 4c, 5d

39. Usted como personal de enfermería encargada de su establecimiento de salud, debe clasificar las Infecciones asociadas a la atención de salud:

1 Desinfección:	**a) Es el proceso de eliminación de toda forma de vida, que implica pérdida de la viabilidad.**
2 Esterilización:	**b) Es el proceso que mata o destruye a casi todos los microorganismos que pueden producir enfermedad.**
3 Limpieza hospitalaria:	**c) Es el proceso que mata o destruye a casi todos los microorganismos que pueden producir enfermedad.**

a) 1c, 2a, 3b

b) 1c, 2b, 3a

c) 1a, 2b, 3c

d) 1a, 2c, 3b

40. Señale uno de los principios básicos para la limpieza y desinfección, después del alta del paciente hospitalario:

a) Comenzar por las áreas más limpias.

b) Comenzar por las áreas más sucias.

c) Realizar la desinfección concurrente después del alta del paciente.

d) Realizar la desinfección concurrente con el paciente

41. Señale uno de los principios básicos para la limpieza y desinfección hospitalaria:

a) La limpieza de las superficies es debajo hacia arriba para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último en recoge

b) La limpieza debe comenzar por las vías sucias y por ultimo las áreas limpias para evitar la contaminación

c) La limpieza debe comenzar por las vías aéreas más bajas a las más altas para evitar turbulencia en la habitación

d) La limpieza debe comenzar por las áreas limpias y por ultimo las áreas sucias y desde las más alta salas más bajas

CONFIDENCIAL

42. Relacione las vías de administración con las características del Proceso de absorción que corresponda

VIAS DE ADMINISTRACION	CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ABSORCION
1 Vía oral	**a) La superficie de absorción e altamente vascularizada**
2 Vía sublingual	**b) Superficie de absorción extensa, debido al grosor de la capa mucosa**
3 Vía intramuscular	**c) Escasa vascularización y su absorción es más lenta**
4 Vía subcutánea	**d) Se absorbe a través de los capilares sanguíneos**

a) 1a, 2b, 3c, 4d

b) 1c, 2a, 3b, 4d

c) 1c, 2b, 3a, 4d

d) 1d, 2b, 3c, 4a

43. El diagnostico de enfermería es el enunciado que explica y describe el Estado de salud, problema real o potencial en los procesos vitales de una persona. ¿Cuál es la estructura secuencial de un diagnostico real?

a) Etiqueta diagnostica + factores relacionados + factores etiológicos

b) Etiqueta diagnostica + características definitorias + factores relacionados

c) Etiqueta diagnostica + problema + factores relacionados

d) Etiqueta diagnostica + factores relacionados + características definitorias

44. Paciente de 50 años con cuadro de emergencia hipertensiva, el cual requiere tratamiento antihipertensivo de administración intravenosa para inmediata biodisponibilidad. Seleccione el fármaco de elección

a) Diltiazem

b) Nitroprusiato de sodio

c) Captopr

d) Metildop

CONFIDENCIAL

45. Seleccione el objetico de la limpieza de las manos mediante fricción antiséptica con un preparado de base de alcohol (PBA)

a) Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos

b) Remover la flota transitoria y la suciedad moderada de las manos

c) Reducir flora residente y eliminar la flora transitoria presente en la piel

d) Eliminar en forma significativa tanto la flora transitoria como la residente

46. De los siguientes enunciados, seleccione los elementos del Componente de Provisión de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud:

1 Reorientación del enfoque curativo

2 Grupos de población a quienes se entrega la atención

3 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica

4 Acercar los servicios de salud a la comunidad

5 Estrategias y herramientas para dar las prestaciones

6 Modalidad es de atención

a) 1, 3,4

b) 2, 3,4

c) 2, 5,6

d) 1, 4,6

47. Al aplicar compresiones torácicas en un adulto que sufrió una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles la profundidad de las compresiones, para considerar como de alta calidad la RCP?

a) 4cm

b) 3cm

c) 6cm

d) 5cm

48. En la atención que se brinda en las consultas prenatales seleccione las acciones que se debe realizar durante el primer trimestre de embarazo:

1 Informar acerca de signos de alarma

2 Determinar la tipología sanguínea

CONFIDENCIAL

3 Detectar preeclampsia mediante toma de TA

4 La asesoría en planificación familiar

5 Control de frecuencia cardiaca fetal

6 Anamnesis de violencia intrafamiliar

a) 1, 3,4

b) 2, 5, 6

c) 2, 3,6

d) 1, 4,6

49. Identifique los cambios fisiopatológicos de la embolia pulmonar:

a) Aumento de la resistencia vascular pulmonar.

b) Se presenta insuficiencia del ventrículo izquierdo.

c) Disminución de la resistencia vascular pulmonar.

d) Disminución de la grasa subcutánea

50. Seleccione los patones funcionales de salud de Marjory Gordon utilizados en la valoración de enfermería.

1 Tolerancia al estrés

2 Respirar normalmente

3 Actividad – ejercicio

4 Dormir y descansar

5 Respirar normalmente

6 Percepción de la salud

a) 1, 3,4

b) 1, 3, 6

c) 2, 3,6

d) 1, 4,6

CONFIDENCIAL

51. El profesional de enfermería para el cuidado integral de la persona, familia o comunidad; utiliza la implementación de las etapas del proceso de atención de enfermería que se interrelaciona entre sí para el logro de objetivo alcanzado ¿a qué características del proceso hace referencia el enunciado?

a) Sistemático

b) Dinámico

c) Sustento teórico

d) Flexible

52. Relacione los niveles de atención con las características de los servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud.

NIVELES DE ATENCIÓN	CARACTERÍSTICAS
Las siguientes son actividades 1. Primero	**a**. Es la puerta de entrada obligatoria al Sistema Nacional de Salud. Se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación.
2. Segundo	**b**. Es el nivel de atención autónomo e independiente de los servicios de salud, que oferta atención desde que se comunica un evento que amenaza la salud.
3. Tercer	**c.** Concentra la experimentación clínica, pre registro o de procedimientos, cuya evidencia no es suficiente para poder instaurarlos en una población.
4. Cuarto	**d**. Prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, son de referencia nacional y resuelve los problemas de salud de alta complejidad.
5. Atención Pre hospitalaria	**e**. Comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización.

a) 1a, 2e, 3d, 4c, 5b.

b) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.

c) 1a, 2d, 3e, 4b, 5c.

d) 1a, 2c, 3b, 4e, 5d.

CONFIDENCIAL

53. Como profesional de enfermería usted va a difundir a los usuarios: políticas públicas, estrategias y servicios de salud, que esta aplicado en el centro de salud en el que trabaja. También proporciona información relevante, sobre tea de promoción e salud y prevención de enfermedades en eventos temáticos y multitematico ¿Cuál es la técnica de aprendizaje cooperativo descrito?

a) Casa abierta.

b) Ferias de la salud.

c) Murgas por la salud

d) Minga por la salud

54. Como profesional de enfermería usted va a difundir a los usuarios: Métodos y técnicas educativas y participativas como, estrategia pedagógica, que esta aplicado en el centro de salud en el que trabaja. También proporciona información relevante, sobre tea de promoción e salud y prevención de enfermedades ¿Cuál es la técnica de aprendizaje cooperativo descrito?

a) Casa abierta.

b) Ferias de la salud.

c) Talleres.

d) Mesa redonda

55. En la provisión e servicios del sistema nacional d salud ¿Cuál es el nivel que enfatiza en la prevención y promoción de salud?

a) El I Nivel de atención

b) El II Nivel de atención

c) El III Nivel de atención

d) El IV Nivel de atención

56. Al realizar la visita domiciliaria usted como personal de salud clasifica a la familia con base a los riesgos de salud, considerando aspectos del ciclo de vida familiar, factores endémicos y de las enfermedades infectocontagiosas. De acuerdo a esto criterio nos referimos

a) socioeconómico

b) epidemiológico

c) demográfico

d) administrativo

CONFIDENCIAL

57 Al realizar la valoración a una paciente de 37 años, la misma refiere que hace un tiempo viene presentando nerviosismo, palpitaciones, que su piel se le enrojece y que siente que las manos le tiemblan, todo esto acompañado de pérdida de peso. Ante estos signos y síntomas, usted interpreta estas manifestaciones como un cuadro de

a) Enfermedad de Addison

b) Hipoparatiroidismos

c) Hipotiroidismo

d) Hipertiroidismo

58. ¿Cuál es el orden de las actividades de enfermería en la recepción del recién nacido?

1. Control de signos vitales.

2. Medidas antropométricas, apego precoz.

3. Apgar al minuto y a los cinco minutos.

4. Aspirar secreciones**.**

5. Administración de credé y vitamina k.

Seleccione una:

a.) 3, 4, 2

b.) 1, 3, 4

c.) 2, 5, 3

d.) 1, 2, 5

59. El modelo de atención integral de salud (MAIS) implementa herramientas y metodología para el diagnóstico y el monitoreo de las condiciones de salud de una población de un determinado espacio territorial en un momento dado ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas y monitoreo del MAIS?

a) Atención individual, atención familia, atención comunitaria

b) Comité de salud, Diagnóstico Situacional, Visita domiciliaria

c) ASIS, Diagnóstico dinámico, Mapa parlante, Sala situacional

d) Ficha familiar, comité de salud, sala situacional

CONFIDENCIAL

60. Los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de dos años son un grupo priorizado de intervención, ya que en esta etapa de la vida se ven implicados numerosos cambios fisiológicos y de desarrollo que condicionarán el alcance de una vida adulta saludable. Nos referimos a:

a) Atención Integral en Salud.

b) Educación y consejería en Salud

c) Corresponsabilidad ciudadana

d) Entorno saludable

61. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las características clínicas de la Glomerulonefritis?

a) Deshidratación, poliuria, hipertensión arterial

b) Hematuria, edema, hipertensión arterial

c) hipertensión arterial, hematuria, hiperalbumnemia

d) hiperalbumnemia, hipolipidemia, hipertensión arterial

62. Ordene las etapas del proceso de las toma de decisiones:

1 Análisis del problema

2 Identificación del problema

3 Investigación de posible soluciones

4 Ejecución de la decisión

5 Selección de las soluciones

6 Evaluación de los resultados

a.) 2, 1, 3, 5, 4, 6

b.) 1, 2, 4, 5, 6, 3

c.) 2, 1, 3, 4, 5, 6

d.) 3, 1, 2, 4, 5, 6

CONFIDENCIAL

63. ¿Cuál de los siguientes tipos de estudios de investigación se clasifica como en estudio experimental?

a) Series de casos

b) Ensayos transversal

c) Estudio de cohorte

d) Ensayo clínico

64. ingresa al servicio de quemado un paciente con lesiones térmicas producido por el derrame de líquidos calientes según refiere. En la valoración se identifican una quemadura de tercer grado en tórax anterior y posterior con una superficie corporal quemada el 36%. ¿Cuál es la principal intervención de enfermería en este caso?

a) Valorar el tipo de quemadura y administrar medicamentos.

b) Vigilar la reanimación de líquidos y control de gasto urinario.

c) valorar el nivel de conciencia y control de signos de alarmas

d) Controlar la gasometría arterial y monitorización cardiacas

65. ¿Qué condiciones debe reunir un paciente previo a la citología cervical?

a) Abstenerse de relaciones sexuales y no realizarse la prueba durante la menstruación

b) Realizar tacto vaginal y lavado con ácido acético previo a toma de muestras

c) Realizar el examen con la menstruación y emplear lubricantes durante el procedimiento

d) Realizar colposcopia previa al examen y lubricar la vagina

66. Durante la atención comunitaria a un recién nacido de 28 días con lactancia materna, con cuadro de diarrea persistente sin signos de deshidratación ¿Qué recomendaciones alimentaria le recomienda a la madre?

a) Mantener la misma frecuencia de alimentación sin variar aliento y líquidos

b) Incorporar jugos dulces que ayuden a evitar la deshidratación

c) Incorporar Tama intermedia de agua para evitar la deshidratación

d) Aumentar la frecuencia de lactancia materna por más tiempo cada vez

CONFIDENCIAL

67. ¿Cuáles son las prácticas estableadas para la seguridad del paciente usuario?

a) Practicas quirúrgicas, conciliación de medicamentos y maneo de bomba de infusión

b) Practicas seguras en medicamentos de riesgo, abreviaturas y prevención de caídas

c) Practicas seguras en la notificación, higiene de manos y seguridad del ´paciente

d) Prácticas seguras administrativas, asistencial y administrativas asistencial

68. ¿Qué examen de laboratorios se realiza para evaluar el grado de control de glicemia en paciente diabético durante los 3 ultimo meses?

a) Prueba de tolerancia oral a la glucosa

b) Glucosa plasmática en ayuno

c) Hemoglobina glucosilada

d) Examen aleatorio de glucosa en sangre

69. ¿Qué medida general se debe implementar en un paciente de 3 años con diagnosticó de neumonía adquirida en la comunidad?

a) Utilización de antitusígenos

b) Ofrecer líquidos

c) Administración precoz de antibióticos

d) Brindar fisioterapia respiratoria

70. Recien nacido que al minuto de su nacimiento presenta llanto debil, tiene alteracones en la frecena resptratora, manos y pies azulados, su freccena cardiaca es de 80 por minutos brezos y pernas con poco movimiento. Deacuerdo con el caso, ¿a que puntaje de APGAR corresponde?

a) 0 - 3

b) 7 - 8

c) 4 - 6

d) 3 – 4

CONFIDENCIAL

71. Paciente de 37 años, a la valoración de enfermería se detecta disnea, inquietud, confusión, letargo, disritmias. Los resultados de la gasometría reportan PH 7.25, PaCO2 56, señale el trastorno de la gasometría

a) Acidosis respiratoria

b) Alcalosis respiratoria

c) Alcalosis metabólica

d) Acidosis metabólica

72. Identifique el reflejo del recién nacido que se examina al desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta del pie, cuya respuesta normal será la hiperextensión del dedo gordo y la separación del resto de los dedos.

a) Reflejo de Galant

b) Reflejo de Moro

c) Reflejo de escalada reflejo de la marcha

d) Reflejo cervical tónico asimétrico

73. Paciente de 70 años que acude al servicio de emergencia por presentar dificultad respiratoria, al momento de la ocultación usted escucha; paso perturbado del aire a través de vías aéreas pequeñas, se oyen al final de la inspiración; generalmente no se aclaran al toser. De acuerdo a lo mencionado a que nos referimos:

a) Sibilancia

b) Roce pleur

c) Crepitantes

d) Roncus

74. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de enfermería de Nightingale en la práctica de enfermería?

a) Cuida y ayuda al paciente para alcanzar su autocuidado total.

b) **Facilita el proceso recuperador del cuerpo manipulando el entorno del paciente.**

c) Desarrollar la interacción entre la enfermera y el paciente.

d) Promover la salud, devolver la salud al paciente y prevenir la enfermedad.

CONFIDENCIAL

75. Trastornos hipertensivos: paciente se encuentra acostada, se debe evitar la posición decúbito supino, por la compresión aorto-cava que provocaría hipotensión, por lo que se sugiere la toma de presión arterial en posición:

a) Usar brazaletes pequeños

b) Tomar la tensión arterial en decúbito lateral izquierdo

c) Tomar la tensión arterial en decúbito lateral derecho

d) Tomar la tensión arterial en decúbito supino

76. Paciente femenina de 32 años que en consulta externas presentas al tomar sus signos vitas presenta los síguete valores: TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 90 mmHg, y ausencia de proteinuria. Descuerdo a sus valores nos estoma refriendo a:

a) Hipertensión crónica

b) Preeclampsia grave

c) Hipertensión gestacional

d) Preeclampsia sin proteinuria

77. Todo el personal de salud debe conocer de sospecha de violencia. Cuando no se pregunta específicamente por violencia, se observa que hasta que la paciente lo relata. Este resultado pone de manifiesto la necesidad de contar con algún sistema de detección de la violencia. ¿Que revería usted como enfermero?

a) Realizar un tamizaje rápido al momento del triaje.

b) Respetar la confidencialidad y la no revictimización

c) Informará al médico/a que la persona presenta sospecha de violencia

d) El médico que recepte el caso identificado como violencia de género

78. Salud sexual y salud reproductiva: Toda la ciudadanía debe tener acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo a su necesidad, sin restricción alguna relacionada con la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva.

a) Equidad

b) Participación social

c) Confidencialidad

d) Espeto a los principios de la bioética

CONFIDENCIAL

79. Paciente con pre inscripción de oxigenoterapia a 3 litros por minutos

¿Cuál es la concentraron de FIO2 administrada por minutos?

a) 24%

b) 28%

c) 32%

d) 36%

80. Los medicamentos: Nefidepina, Sulfato de Magnesio e Hidralasina¿ en qué clave del SCOREMAMA son utilizados?

a) CLAVE VERDE

b) CLAVE ROJA

c) CLAVE AZUL

d) CLAVE AMARILLA

81. Con relación a los cuidados para el manejo adecuado de las náuseas y vómitos en personas en la fase final de vida. Seleccione la opción correcta

a) Iniciar el día con alimentos secos como tostada y galletas de sal.

b) Suministrar bebidas de canela, menta, laurel y jengibre.

c) No ingerir alimentos pesados, picantes, ni bebidas estimulantes como café, gaseosas, té negro, chocolate

d) suministrar medicamentos para las náuseas

82. Al valorar con la herramienta SCORE MAMÁ a una mujer embarazada de 21 semas que presenta lo siguiente parámetros: FC 102, SISTÓLICA 140, DIASTÓLICA 87, FR 22, T(°C) 37°C, Sat O2 94%,Estado de Conciencia Alerta, PROTEINURIA Positivo: Cuál es el puntaje total asignado de acuerdo con los parámetro del caso?

a) 4 puntos.

b) **5 puntos.**

c) 6 puntos.

d) 8 puntos.

CONFIDENCIAL

83. Mujer nulípara, gestante de 38 semanas con los siguientes síntomas: hace 2 horas le salió de su vagina una secreción mucosa, sanguinolenta, abundante de forma espontánea, después de lo cual ha tenido unas concentraciones uterinas que ha ido registrando e las últimas horas de una duración de 30 a 40 segundos con una frecuencia de cada 20 minutos ¿según estas características la paciente s encuentra en la etapa?

a. Primera etapa

b. Segunda etapa

c. Tercera etapa

d. Cuarta etapa

84. En la comunidad donde usted se encuentra haciendo la médicatura rural, hay casos de niños: con erupción y fiebre, La mama refieren que donde viven hay posos de aguas sucias ¿Qué caso se refiere?

a) Caso confirmado

b) Caso probable

c) Caso descartado

d) Caso sospechoso

85. Niño de 5 meses con antecedentes de vacuna de BCG y Hb pediátrica, acude al centro de salud para seguir el esquema nacional de vacunación ¿Qué vacunas se deben administrar?

a) DPT, pentavalente, neumococo.

b) Ipvf, neumococo, pentavalente.

c) Ipvf, rotavirus, pentavalente.

d) bOPV, neumococo, pentavalente.

86. **¿Qué tipo de aislamiento requiere un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar?**

a) Aislamiento por fluidos

b) Aislamiento por gotas

c) Aislamiento por aire

d) Aislamiento por contacto

CONFIDENCIAL

87. La_____ puede deberse a un exceso de insulina, actividad física extenuante o poca ingesta de alimentos. En caso de una cantidad nula de insulina disponible en el organismo, se produce_____, caracterizada por hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. El cuadro clínico que incluye hipotensión, deshidratación intensa y signos neurológicos corresponde a _____.

a) Cetoacidosis diabética – nefropatía – complicaciones microvasculares

b) Hipoglicemia – cetoacidosis diabética – síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico

c) Hipoglicemia – síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico – nefropatía.

d) Hiperglicemia – cetoacidosis diabética – nefropatía

88. En el centro de salud donde usted trabaja se presenta el caso de Presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso en un área geográfica determinada. ¿Cuál es el tipo de vigilancia epidemiológica que corresponde este caso?

a) Pandemia

b) Brote

c) Epidemia

d) Endemia

89. Los pacientes sometidos a quimioterapia, habitualmente refieren "sabor metálico" de los alimentos. ¿Cuál es la medida para disminuir esta alteración del gusto?

a) Comidas picante, porque disminuyen esta sensación

b) Restringir el consumo de alimentos tibios

c) Cepillado bucal en forma vigorosa y enjuagarse frecuentemente

d) Restringir el consumo de carnes rojas

90. Al realzar la valoración de enfermería a un paciente con fractura costales a sufrir un accidente de tránsito; presenta disnea, deformidad en la pared torácica, uso de los músculos accesorios para respirar; falta de aliento y aleteo nasal ¿Qué diagnóstico de enfermería pertenece este caso?

a) Deterioro de la integridad tisular

b) Deterioro del intercambio de gases

c) Deterioro de la ventilación espontanea

d) patrón respiratorio ineficaz.

CONFIDENCIAL

91. Una persona que se encuentra en la fase final en la vida al ser valorada presenta: valores de hb de 10 g/dl, disminución de la fuerza muscular, disminución del índice de masa grasa corporal y pérdida de peso del 10 % en el último año. Seleccione el criterio mayor para el diagnóstico de caquexia:

a) disminución de la fuerza muscular

b) pérdida de peso del 10 % en el último año

c) hemoglobina de 10 g/dl

d) disminución del índice de masa grasa corporal

92. Como profesional de enfermería usted asisten un procedimiento aséptico, el paciente se encuentra desorientado y accidentalmente toca el campo estéril con su mano ¿cuál es la acción a seguir?

a) continuar con el procedimiento para evitar más contaminación

b) mantener bajo vigilancia al campo estéril para evitar otra contaminación

c) descartar los implementos y colocar un nuevo campo estéril

d) sujetar la mano del paciente para que no siga contaminad

93. Cuál es la acción inmediata para eliminar la obstrucción de una sonda nasogástrica para alimentación?

a) Extraer la sonda y limpiarla con gasa para reutilizar

b) Usar una sonda estéril nueva

c) Infundir bebidas carbonatadas

d) Infundir agua tibia con presión suave

94. usted como líder de un servicio hospitalario se encuentran demostrando el procedimiento e lavado de manos a un grupo de estudiante de enfermería que ingresas a realzas sus prácticas. Al iniciar el procedimiento lo deben realizar después de la exposición con fluidos corporales ¿A qué momento de higiene de manos se refiere?

a) Momento 1

b) Momento 2

c) Momento 3

d) Momento 4

CONFIDENCIAL

95. Paciente con pre inscripción de oxigenoterapia a 4 litros por minutos

¿Cuál es la concentraron de FIO2 administrada por minutos?

a) 24%

b) 28%

c) 32%

d) 36%

96. Seleccione las manifestaciones clínicas de infarto agudo de miocardio no complicado:

1 Disminución de la tolerancia de la actividad

2 Dolor torácico de inicio súbito

3 Edema en regiones declive

4 Ansiedad

5 Ortopnea

6 Piel pálida y diaforética

a) 2, 3, 5

b) 2, 4 ,6

c) 3, 4, 5

d) 1, 3, 6

97. Paciente que permanece encamado con movilidad muy limitada, al examen físico se observa herida en región sacra de espesor completo y se extiende al tejido subcutáneo y necrosis. ¿Qué etapa en la evolución de las ulceras por presión corresponde el caso?

a) Etapa I

b) Etapa II

c) Etapa III

d) Etapa IV

CONFIDENCIAL

98. Niño de 8 meses es traído por su madre al centro de salud para ser vacunado, la madre refiere que no lo pudo traer a los 6 meses por estar enfermo y luego se olvidó. La enfermera al revisar el carnet de vacunación consta que solo le han administrado las vacuas correspondientes hasta los 4 meses. En este momento ¿Qué vacunas y que números de dosis le corresponde administrar al niño?

a) Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3era. Dosis), OPV (1era. Dosis)

b) Pentavalente (3era.Dosis), Neumococo (2era. Dosis), Varicela (1da. Dosis).

c) Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3da. Dosis), SRP (1era. Dosis)

d) Pentavalente (3era. Dosis), Neumococo (3da. Dosis), IPV (2era. Dosis)

99. Señale la escala utilizada para valorar el riesgo de ulceras por presión que incluye; percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y cizallamiento:

a) Escala de Macdems

b) Escala de Braden

c) Escala de Downes

d) Escala de Glasgow

100. Para la utilización de soluciones endovenosas en la transfusión de sangre sin dañar sus componentes ¿Qué solución es la recomendada?

a) Plasma grupo O positivo.

b) Solución salina al 0.9 %.

c) Solución salina al 3 %.

d) Lactato de Ringer

101. Cuál es la solución cristaloide que restaura el volumen intravascular y neutraliza la acidosis cuando se degrada en bicarbonato?

a) Dextrosa al 5%

b) Solución salina al 0.9 %.

c) Solución salina al 0.45 %.

d) Lactato de Ringer

CONFIDENCIAL

102. Selecciones e tipo de vacuna que debe administrarse a un paciente con VIH/Sida, con n recentro de CD4 mayor de 200 cel/mm3, que administración requiere 3 dosis (0, 1, 6 meses) remendándose administrar una 4ta y una 5ta dosis si no hay una respuestas adecuada

a) Influencia estacionaria

b) Fiebre amarilla

c) Tétanos.

d) Hepatitis B.

103. Al realizar el examen físico de las extremidades. Usted encuentra una zona tematizada, al presionar durante varios segundos y después soltar tiene una profundidad de 6 mm ¿Cuál es grado de edema que corresponde?

a) Edema 1+

b) Edema 2+

c) Edema 3+

d) Edema 4+

104. Un grupo e profesionales de enfermería en un servicio de salud, mantienen un ambiente de trabajo respetuoso y de colaboración ¿a qué elemento código Deontológico del Consejo Internacional de enfermera se refleja el comportamiento de este grpo?

a) La enfermera y las personas

b) La enfermera y la práctica

c) La enfermera y la profesión

d) La enfermera y sus compañeros de trabajo

CONFIDENCIAL

105. Usted como enfermera del centro de salud debe notificar las enfermedades sujeta a vigilancia. Relaciones los tipos de notificación obligatoria que reporta en el SIVE alerta con sus respectivas características:

TIPO DE NOTIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
1. Individual	a)Notificación inmediata al epidemiólogo del distrito
	b)Notificación obligatoria de forma agrupada por edad y sexo
2. Agrupada	c)Sospecha de un caso de enfermedad respiratoria obligatorio
	d)Casos confirmado de enfermedad de reporte obligatorio

a) 1ac, 2bd

b) 1ab, 2cd

c) 2ac, 1bd

d) 2ab, 1cd

106. Recién nacido prematuro, a los 10 minutos posterior al nacimiento presenta signos de dificulta respiratoria, cianosis, bradicardia, saturación de oxígeno en descenso, asimetría torácica con sobre expansión del hemitórax derecho, ruidos cariacos alejados. ¿Cuál es el objetivo prioritario en el cuidado de enfermería?

a) Tener una política e cuidados centrado en la familia con ingreso y restricción de los padres en cualquier momento del día

b) Mantener los niveles de oximetría de pulso dentro de los rangos recomendados

c) Cuidados de la vía Central o periférica

d) Mantener la integridad de la piel para evitar lesiones

107 A la visita domiciliara usted se encentra con una familia de bajas recurso; la mama refiere que sus hijo solo comen una vez por día, a la valoración usted ve signos puede presentarse acompañada de edema bilateral hasta anasarca, grados de emaciación hasta el marasmo y otros signos clínicos ¿según el caso se está refiriendo a:?

a) Bajo peso

b) Desnutrición aguda moderada

CONFIDENCIAL

c) Desnutrición aguda severa

d) Insuficiencias de micronutrientes

108. Adulto mayor de 78 años que acude al servicio de salud por los últimos días sea sentido deprimido. A la valoración usted le pregunta ¿Está usted satisfecho con la vida que lleva? ¿Ha dejado de hacer las cosas que le gustan? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente aburrido frecuentemente?: ¿conque escala lo valora usted a este paciente?

a) Escala de Macdems

b) Escala de Downes

c) Escala Yesavage

d) Escala Katz.

109. Señale los hallazgos de gravedad o afectación de órgano blanco en una embarazada que presenta preeclampsia

1 Trombocitopenia

2 Septicemia

3 Enzimas hepaticas elevadas

4 Edema pulmonar

5 Implantación baja de placenta

a) 1, 3, 5

b) 1, 3, 4

c) 2, 4, 5

d) 2, 3, 4

110. ¿Cuál es el cuidado de enfermera que se debe aplicar en la administración y lectura de la tuberculina?

a) Administrar la tuberculina por vía intradérmica

b) Administrar la tuberculina por vía subcutánea

c) Realizar la lectura dentro de las 24 horas de inyectar la tuberculina.

d) Medir toda el área eritemosa documentada el tamaño de la zona

CONFIDENCIAL

111. Paciente permanece en el servicio de neurología por presentar trauma craneoencefálico severo. A la valoración de enfermería se observa que el paciente se encuentra somnoliento, a la monitorización se determina presión intracraneal elevada, según la preinscripción médica se solicita administrar una solución Hipertónica ¿Cuál es la solución que se debe preparar para la administración?

a) Solución de Dextrosa al 5%

b) Solución de Lactato de Ringer

c) Solución salina al 0.9%.

d) Solución salina al 3%

112. ESAVIS grave: Al servicio de vacunas llega una madre con un niño de 6 meses; la madre refiere que hace 2 meses presenta linfadentis supurativa a la vacuna ¿qué vacuna produce linfadentis supurativa?

a) S R P

b) OPV

c) DPT

d) BCG

113. ¿cuál es la medidas preventivas, primaria en paciente con factores de riesgo de transición venosa profunda?

a) Profilaxis de medicamentos dentro de las 48 horas

b) Inmovilización del paciente para evitar complicaciones

c) hidratación de los pies en las zonas afectada

d) vigilar el estado nutricional del paciente

114. Paciente hospitalizado hipertensión intracraneal, temperatura de 36.2°C, pulso 90 por minuto y tensión arterial 110/90.se refiere a pacientes cuidado especiales: distinguimos desde un punto de vista terapéutico y **Favorecer el retorno venoso: ¿Cuál es el cuidado de enfermería primordial?**

a) Saturación de oxígeno mayor de 90% y presión de oxígeno mayor de 80 mmHg

b) Posición neutra de la cabeza, con cabecera elevada a 30 grados.

c) Monitorización de la presión intracraneal a través de un drenaje ventricular si es posible

d) establecer como meta una presión arterial media alta, para que la presión de perfusión cerebral sea la adecuada, mantener un hematocrito mayor de 21 y hemoglobina mayor de 7 g/dL.

CONFIDENCIAL

115. Ordene los Servicios de enfermería en Administración:

1) Se interpreta el diagrama

2) Seleccionar el problema

3) Se procede a encontrar las causas de las mismas

4) Se enumeran las posibles causas

a) 1, 4, 3, 2

b) 2, 4, 3, 1

c) 1, 2, 3, 4

d) 3, 4, 1, 2

116. Ordenes las Normativa de referencia y contra referencia en servicio de salud:

1) Hoja de cuidados intensivos

2) Censo diario de pacientes

3) Solicitud de medicamentos

4) Vales a la central de equipos

a) 1, 4, 3, 2

b) 1, 2, 3, 4

c) 2, 4, 3, 1

d) 3, 4, 1, 2

117. Todo evento adverso que haya derivado en la muerte del paciente o la pérdida permanente e importante de una función, de carácter imprevisto y sin relación con la evolución natural de la enfermedad o el trastorno subyacente del paciente. ¿A que nos referimos?

a) Evento adverso no evitable

b) Evento adverso evitable

c) Evento adverso

d) Evento centinela

CONFIDENCIAL

118. Usted como líder del equipo de salud debe realizar una reunión con uno de sus miembros frente a un incidente suscitado con el equipo de trabajo. ¿Qué nivel de comunicación esta aplacando?

a) Comunicación transpersonal

b) Comunicación en grupos pequeños

c) Comunicación interpersonal

d) Comunicación intrapersonal

119. El electrocardiograma es el registro grafico de la actividad eléctrica del corazón. Relaciones las odas con la definición que corresponde:

ONDAS	DIFFNICIONES
1 Onda P	**a) Representa la repolarización de la fibras de Pu**
2 Complejo QRS	**b) Representa la repolarización ventricular**
3 Onda T	**c) Representa la despolarización ventricular**
4 Onda U	**d) Representa la despolarización auricular**

a) 1d, 2c, 3b, 4a

b) 1b, 2a, 3d, 4c

c) 1c, 2d, 3a, 4b

d) 1a, 2b, 3c, 4d

120. En el proceso enfermero comunitario ¿Cuáles la fase en la que se identifican los problemas de la comunidad?

a) Valoración

b) Planificación

c) Ejecución

d) Evaluación

121. Al realizar la medición de la Presión Venosa Central (PVC) esta brinda información sobre:

a) Precarga

b) Postcarga

c) Resistencia vascular pulmonar

d) Frecuencia vascular sistémica

CONFIDENCIAL

122. Al valorar un paciente con antecedente de tumor hepático con coloración amarilla verdosa de la piel. Usted se encuentra frente a na defunción hepatita conocida como:

a) Ictericia hepatocelular

b) Hiperbilirrubinemia hereditaria

c) **Ictericia obstructiva**

d) Ictericia hemolítica

123. Al valorar a un niño de 4 meses de edad, en la exploración física de la cadera usted Al abrir la pierna como un libro no sobrepasa los 60°:¿qué Signos a descartarse en la exploración física de la cadera en niños?

a) Signo de Ortolani positivo

b) Signo de Barlow positivo

c) Limitación de la abducción

d) Signo de Galeazzi

124. Mujer con 24 semanas de embarazo, presenta, aumento progresivo del dolor, de las contracciones o de la hemorragia, con modificaciones cervicales o ruptura de membranas: con frecuencia cardiaca fetal 80 latidos por minutos, frecuencia cardiaca materna 90 latidos por minutos, presión arterial 100/90 mmhg. ¿Cuál de las siguientes opciones es el diagnostico?

a) **Aborto en curso**

b) Amenaza de aborto

c) Aborto diferido

d) Aborto incompleto

125. La dermatitis atópica (DA) es una inflamación de la piel que evoluciona en tres fases recurrentes, principal manifestación en la DA, del láctate o pediátrico o infancia:

a) Liquenificacion en forma de placa

b) Piel seca y áspera en otras zonas

c) **Enrojecimiento de las mejillas**

d) Prurito intenso que afecta al sueño

CONFIDENCIAL

126. Al administrar un medicamento por vía intradérmica usted verifica que una vez administrado, no se observa la pápula en el sitio de inyección ¿Cuál es su intervención?

a) Dar un masaje en la región hasta observar la pápula.

b) Aspirar para verificar la correcta administración del medicamento

c) Repetir administración del medicamento hasta observar la pápula

d) Registrar el hecho según la política de la institución

127. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador: Como se define la Muerte Materna

a) Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo, o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

b) Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.

c) Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo

d) Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier causa

128. Paciente de 10 años con diagnóstico de neumonía bacteriana que requiere administración de oxígeno a una concentración de 28% ¿Qué dispositiva emplea en este caso?

a) Cascara facial simple

b) Catéter nasal

c) Mascara sin reciclador

d) Mascara con reciclador parcial

129. Al brindar cuidados de enfermería a pacientes con hipotiroidismo ¿cuál de las siguientes intervenciones usted realiza?

a) Promover el uso de fuentes de calor externas para mantener la temperatura corporal

b) Incrementar el uso de laxantes en los pacientes para prevenir la constipacion

c) Proporcionar una capa adicional de ropa adecuada y evitar la exposición al frio

CONFIDENCIAL

d) Incentivar y orientar sobre el uso de hipnóticos y sedantes para aliviar el insomnio y el nerviosismo.

130. Relaciones el evento con sus respectivos casos:

NOTIFICACIÓN DEL EVENTO	DEFINICION
1) Cuasi evento	**a) paciente con una vía periferia con eritema, edema, cordón venoso palpable**
2) Evento adverso	**b)paciente que en la administración una mediación por una vía inadecuada y produce la muerte**
3) Evento centinela	**c)paciente con homónimo que necesita ser preparado para realizar endoscopia**

a) 1b, 2c, 3a

b) 1c, 2a, 3b

c) 1a, 2b, 3c

d) 1b, 2a, 3c

131. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol?

a) Naloxona

b) Neostigmine

c) Flumazenil

d) N-Acetylcisteina

132. Mujer de 60 años acude a consulta externa, manifiesta que tras haber iniciado tratamiento para la hipertensión arterial, con fármaco que no especifica, presenta edema de miembros inferiores ¿Cuál de los siguientes medicamentos, produce este efecto secundario?

a) Losartan

b) Enalapril

c) Labetalol

d) Amlodipino

CONFIDENCIAL

133. De las siguientes condiciones clínicas selecciones los que corresponde al estadio clínico III de las enfermedades del VIH, en adultos y adolecentes (OPS):

1 Pérdida de peso más del 10% sin causar conocida

2 Linfadenopatia persistente generalizada

3 Tuberculosis pulmonar actual

4 Erupción popular pruriginosa

5 Herpes zoster

6 Gingivitis estomatitis o periodontitis ulcerativa necrotizantes

a) 1, 4 ,5

b) 1, 3, 6

c) 2, 4, 6

d) 2, 3 ,6

134. Según las preinscripciones médicas le piden administras tramadol 10mg intravenoso: ordene las secuencias de enfermería que debe tomar en cuenta en la administración:

1 Diluir el medicamento antes de la administración

2 Controlar el patrón resriptorio

3 Valorar la acción analgésica del tramadol

4 Controlar la velocidad en la administración del fármaco

5 Controlar las náuseas y vómitos por efectos adversos

a) 2, 1, 4, 5, 3

b) 1, 2, 3, 5, 4

c) 3, 4, 5, 1, 2

d) 2, 1, 3, 4, 5

135. Paciente femenina de 35 años acude al servicio de emergencia por Desarrollar convulsiones tónico - clónicas generalizadas durante el embarazo, a la valoración usted observas edemas en las arte inferir y otras patologías o condiciones neurológicas. Descuerdo al caso estoma refriendo a:

a) Eclampsia

b) Preeclampsia grave

CONFIDENCIAL

c) Hipertensión gestacional

d) Preeclampsia leve

136. Seleccione las complicaciones más habituales ocasionadas por los catéteres venosos periféricos en los neonatos:

1. Flebitis

2. Embolia grasa

3. Extravasación

4. Hemorragias

5. Obstrucción

6. Extracción accidental

a) 2, 4, 5, 6

b) 2, 3, 4, 5

c) 1, 2, 4, 5

d. 1, 3, 5, 6

137. Identifique la etapa del parto en la que comienza la separación de la placenta del útero, después que se reanudan las contracciones uterinas.

a. Primera etapa

b. Segunda etapa

c. Tercera etapa

d. Cuarta etapa

138. ¿Qué coloración espera encontrar al examinar los loquios de una puérpera en el día once del posparto?

a. Rosada

b. Roja

c. Blanca

d. Amarronada

CONFIDENCIAL

139. ¿Qué tipo de tendido de cama se debe realizar en un paciente ambulatorio?

a. Cama post-quirúrgica

b. Cama ocupada

c. Cama abierta

d. Cama cerrada

140. ¿Qué recomendación emplea para calentar un recién nacido hipotérmico? Seleccione una:

a) Realizar el calentamiento rápido al recién nacido

b) Aumentar la temperatura de la incubadora 5 ºC por encima de la temperatura del recién nacido.\ Si la temperatura del RN es menor de 36,5 ºC, realizar el calentamiento lentamente entre 0,5 ºC -1 ºC por hora. El rápido recalentamiento puede asociarse con mayores problemas orgánicos, metabólicos, cutáneos y

c) Realizar calentamiento lentamente entre 0.5°-1°C por hora

d) Utilizar sueros calientes en botellas de agua

141. Cuál es la dosis de impregnación de sulfato de magnesio en preemclasia para prevenir convulsiones?

a) 1 g intravenosa en 60 minutos

b) 6 g intravenosa en 20 minutos

c) 4 g intravenosa en 60 minutos

d) 4 g intravenosa en 20 minutos

142. ¿Cuál es la complicación obstétrica responsable de activar la clave azul teniendo en cuenta el SCOREMAMA?

a) Hemorragia postparto

b) Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

c) Eclampsia

d) Sepsis severa

CONFIDENCIAL

143. Al educar a los padres con respecto al cuidado del Recién Nacido, de evitar calo en la cuna, cerca de una ventana abierta, un ventilador o aire acondicionado a que mecanismo de prevención de perdida de calor se está refiriendo?

a) Radiación.

b) Convección.

c) Evaporación.

d) Conducción

144. En la consulta de atención prenatal usted valora una embarazada, de 29 años. Con G6, P2, A4, sus dos hijos nacieron a las 38.6 y 39.2 semanas respectivamente. Con peso de 3240 g y 3700 g ¿identifique el factor presente en el caso descrito que se asocia con mayor mortalidad y morbilidad perinatal?

a) Numero de gestas

b) Edad de la madre

c) Peso de los hijos al nacer

d) Edad gestacional al momento del parto

145. Selecciones los diagnósticos de enfermería que puede aplicar a las madres que están sufriendo un parto hipertónico:

1. Falta de conocimiento relacionado con las contracciones uterinas secundarias al parto disfuncional

2. Dolor relacionado con la incapacidad de la mujer para relajarse como consecuencia de las contracciones

3. Adaptación individual ineficaz relacionada a las técnicas de respiración

4. Reconocer los problemas relacionado con la falta de información sobre el embarazo postérmino

5. Ansiedad relacionada con una progresión lenta del parto

6. Riesgo de lesiones relacionadas con la dilatación

a) 1, 3, 5, 6

b) 2, 3, 4, 5

c) 2, 4, 5, 6

d) 1, 2, 4, 5

CONFIDENCIAL

146. ¿Cuál de los siguientes comportamientos es más favorable después de la muerte de un recién nacido en el momento del parto?

a) Cumplir estrictamente las políticas de la institución y evitar el ingreso de familiares

b) Continuar la atención médica y de enfermería a la madre después del parto.

c) No hay diferencias a los tres meses en la incidencia de partos

d) En mujeres con analgesia epidural, se ha observado que el parto con pujos no dirigidos

147. Paciente de 66 años con diagnostico medico de neumonía adquirida en la comunidad, con disnea, frecuencia respiratoria de 25 por minuto, cianosis distal y una gasometría arterial que muestra los siguientes valores PH 7.30, PaO2 de 55mmHg, PaCO2 de 48 mmHg ¿Cuál es el diagnostico de enfermería en este paciente?

a) Gasometría arterial anormal relacionada con hipercapnia manifestada por deterioro del intercambio de gases

b) Dolor relacionado con la incapacidad de para relajarse como consecuencia a la alcalosis respiratoria

c) Deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo capilar manifestado por hipoxia e hipercapnia

d) Deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo capilar manifestado por intercambio de gases

148. Cuál de las siguientes intervenciones se realiza en un parto en el que se presenta un prolapso del cordón umbilical?

a) Reintroducir el cordón expuesto en la vagina

b) Colocar a la paciente en posición tredelemburg

c) Preparar medicamentos que aumenten las contracciones uterinas

d) Realizar maniobra de Kristeller

149. Paciente de 55 años con diagnóstico médico de tuberculosis pulmonar; con tratamiento de Isoniacida y Rifampicina, ha demostrado resistencia al tratamiento de esto fármacos: A que nos referimos:

a) Monorresistencia

b) Multidrogorresistencia

c) Polirresistencia

d) Resistencia a rifampicina

CONFIDENCIAL

150. Como profesional de enfermería usted debe realizar una irrigación vesical continua a un paciente con daño en la uretra. ¿Qué dispositivo elige para este procedimiento?

a) Tamaño 30 cm , # 18Fr, tres vías.

b) Tamaño 40 cm, # 18 Fr, dos vías.

c) Tamaño 15 cm , # 20Fr, dos vías.

d) Tamaño 20 cm , # 10Fr, tres vías.

151. Señale la técnica correcta para la administración de gotas oticas en un paciente adulto:

a) Traccionar el pabellón auricular hacia atrás y abajo

b) **Traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás**

c) Traccionar el pabellón auricular hacia atrás y delante

d) Traccionar el pabellón auricular hacia atrás

152. En el shock septo del recién nacido pretermino hay intervenciones importantes que debe conocer el personal de salud ¿Qué intervenciones se realiza en el minuto 0?

a) Dopamina 5 – 10 mcg/kg/min

b) Reconocer disminución de perfusión y cianosis

c) Corregir hipoglicemia o hipocalcemia. Iniciar antibióticos

d) Epinefrina 0,05 a 0.3 mcg/kg/min

153. ¿Qué escala de valoración corresponde con las siguientes categorías de evaluación: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad, e incontinencias?

a) Escala de Morse

b) Escala de Norton

c) Escala de Brande

d) Escala de Macdams

154. paciente que ingresa a servicio de emergencia: y necesita ser tras función de sangre lo cual poner peligro su vida; y se niega al tratamiento por su religión ¿Qué derecho se esta vulnerando?

a) Derecho a decidir

b) Derecho a no ser discriminado

c) Derecho a la información,

CONFIDENCIAL

d) Derecho a la confidencialidad

155. Usted como enfermero está al servicio de cuidado paliativos ¿Cuál es principal cuidado de enfermería?

a) Brindar atención al paciente en centros de salud especializados.

b) Cuidar a las personas que tiene enfermedades crónicas, avanzadas e incurables

c) Se enseña a la familia y amigos como cuidar a su ser querido

d) Cuidar a las personas que tiene no tiene enfermedades crónicas, avanzadas e incurables

156. Señales los métodos físicos de desinfección

1 **Pasteurización**

2 Pre - enjuague con agua tibia

3 **Desinfectadores de agua**

4 Enjuague tibio

5 Secado

6 **Radiación ultravioleta**

a) 1, 3, 5

b) **1, 3, 6**

c) 2, 4, 5

d) 2, 4, 6

157. De las siguientes condiciones clínicas selecciones los que corresponde al estadio clínico II de las enfermedades del VIH, en adultos y adolecentes (OPS):

1 **Herpes zoster**

2 Candidiasis oral

3 **Dermatitis seborreica**

4 Leucoplasia oral vellosa

5 Tuberculosis pulmonar actual

6 **Erupción papular pruriginosa**

a) 1, 3, 5

CONFIDENCIAL

b) **1, 3, 6**

c) 2, 4, 5

d) 2, 4, 6

158. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador: Como se define la Tasa de natalidad, nacidos vivos

a) Número de menores de 1 año

b) Número de muerto de 1 año

c) Número de nacidos vivos en el año

d) Número de nacidos vivos en todos los años

159 Con relación a la insulina comercializadas, en el caso de la ínsula NPH para un correcto manejo es importante saber su farmacocinética: ¿Cuál es la duración de acción de este tipo de insulina?

a) 6 a 8 horas

b) 8 a 12 horas

c) 13 a 16 horas

d) 18a 20 horas

160. Usted como personal de salud, empleado para el transporte de vacunas entre diferentes niveles, utilizada para conservación de biológico a temperatura adecuada por 16 a 60 horas. Para su funcionamiento requiere de paquetes fríos o hielo seco: ¿A que nos referimos?

a) Congelador

b) Caja térmica

c) Termos

d) Cuarto frío

161. Con reicicion a los cuidaos de enfermería en la recolección de una muestra de sangre capilar para la medición de la glicemia: señale el enunciado correcto

a) presionar fuertemente el lado punción do para obtener la muestra de sangre

b) En los adultos se debe obtener la muestra capilar de los extremos de los dedos

c) Pedir al paciente que se lave las manos con agua tibia y jabón previo a la punción

d) Antes de tomar la muestras aplicar presión en el sitio de punción con una torunda con alcohol

CONFIDENCIAL

162. ¿Cuál es el enunciado correcto con relación a la trombosis venosa profunda?

a) El reposo en cama aumenta el flujo sanguíneo en las piernas

b) La ostosis venosa ocurre cando el flujo venoso aumenta

c) La coagulación sanguínea alterada es un factor de riesgo de trombosis venosa profunda

d) La movilización frecuente incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda

163. Usted debe desarrollar un proyecto de investigación pero antes de realizar su estudio debe identificar la variable en lo que su resultado eviten sus alterados al medir al fenómeno a estudiarse: ¿cal es la variable que hace referente al enunciado?

a) Variable Cuantitativa

b) Variable nomnal

c) Variable Independiente

d) Variable Cualitativa

164. ¿Cuál es el método anticonceptivo recomendado para una mujer de 38 años con 3 semanas post parto y lactancia materna exclusiva?

a) Anticonceptivos orales combinados

b) Dispositivos intrauterino de cobre

c) Método del moco cervical bllig

d) Amenorrea de la lactancia

165. Las enfermeras de un centro de salud tiene un liderazgo en tema de promoción de salud en su comunidad a pesar de los conflictos que se presentan con los líderes: han logrado bajar la tasa de enfermo de influenzas mediante acciones de promoción como campaña de vacunación con volantes, perifonios, visita a las instituciones educativas y domiciliarias ¿a qué principio de modelo de atención integral de salud corresponde a estas acciones?

a) Continuidad

b) Integralidad

c) Equidad

d) Universalidad progresiva en el acceso y la cobertura

CONFIDENCIAL

166. ¿Cuál es la teorizante que habla de las condiciones y las fuerzas extrema que influyen en la vida y el desarrollo de un organismo?

a) Betty Neuman

b) Florence Nightingale

c) Ida Oriando

d) Dorothea Orem

167. Como personal de enfermería del servicio de pediatría usted debe administrar una inyección intramuscular con un medicamento de origen biológico a un lactante. ¿cuál es el sitio de administración?

a) Deltoides

b) Ventrogluteo

c) Vasto lateral

d) Glúteo mayor

168. El sistema integrado de vigilancia epidemiológica. Se crea la dirección Nacional d Vigilancia Epidemiológica y tiene como subsistema él SIRVE ALERTA. ¿ a qué corresponde SIRVE ALERTA?

a) Integrar los subsistemas

b) A emergencias sanitarias

c) Registro de mortalidad

d) Registro de egresos hospitalarios

169. Al valorar con la herramienta SCORE MAMÁ a una mujer embarazada de 21 semas que presenta lo siguiente parámetros: FC 104, SISTÓLICA 130, DIASTÓLICA 80, FR 23, T (°C) 38°2C, Sat O2 95%, Estado de Conciencia Alerta, PROTEINURIA Negativo ¿Cuál es el puntaje total asignado de acuerdo con los parámetro del caso?

a) **4 puntos**.

b) 5 puntos.

c) 6 puntos.

d) 8 puntos.

CONFIDENCIAL

170. ¿Cuál es la inmunidad que se consigue cuando se administra una vacuna?

a) Inmunidad natural activa.

b) **Inmunidad artificial activa.**

c) Inmunidad artificial positiva

d) Inmunidad natural positiva

171. Como profesional de enfermería en atención primaria para cumplir con el plan intersoriar de alimentación y nutrición Ecuador y el paquete de presentaciones para la mujer embarazada. Usted activa la red local de mujeres embarazadas ¿a qué componente corresponde la descripción operativa señalada?

a) Educación y consejería en Salud

b) Seguimiento

c) Captación

d) Corresponsabilidad ciudadana

172. A que faces de las enfermedades crónica corresponde la siguientes discreción: ocurre la aparición de síntomas detéctale relacionado con el trastorno crónico incluyen el periodo de estudios diagnóstico de falta de corteza conforme el paciente espera y en piensa a descubrir su enfermedad y afrontar las complicaciones:

a) Asintomática

b) Estable

c) Sintomática

d) Inestable

173. En la vista domiciliaria a familias extendidas integradas por 15 personas todas las generaciones han padecido e cáncer y algunos han muertos por diabetes viven e condiciones sanitarias inadecuadas y no asisten a centro de salud para el control médico regula ¿Cuál es el criterio de selección aplicado en la visita domiciliaria descritas?

a) Epidemiológico

b) Demográfico

c) Administrativos

d) Socioeconómico

CONFIDENCIAL

174. Paciente de 40 años se encuentra hospitalizado a la valoración pulmonar se ocultan ruidos fuertes sobre los conductores pulmonares más grandes como los bronquiolos: en ocasiones pueden sentirse a través del tórax. Señale el tipo de ruido pulmonar adventicio se refiere el enunciado:

a) Sibilancias

b) Estridor

c) Gorgoteo

d) Crepitaciones

175. Una paciente de 17 años solicita orientación sobre la aplicación de la vacuna para VPH ¿Cuál sistema se aplica según la teoría de los sistemas planteada por Dorothea Oren?

a) Autocuidado

b) Apoyo educativo

c) Totalmente compensador

d) Parcialmente compensador

176. ¿Cuáles son los métodos educativos directos utilizados en la educación en salud?

a) Análisis de textos, de problemas, valoraciones de situaciones y discusiones

b) Simulaciones, juegos, demostración y análisis de situaciones

c) Foto- palabras, cuestuarios, dibujos, palabras y tormentas de ideas

d) El diálogo, clase magistral, charla y discusión de grupo

177. Cuál de las siguientes opciones corresponde con las manifestaciones clínicas de la acetoacidosis diabática

a) Hipoglucemia, deshidratación, alcalosis metabólica

b) Hiperglucemia, deshidratación, acidosis metabólica

c) Hipoglucemia, deshidratación, acidosis metabólica

d) Normoglucemia, sobrehidratación, alcalosis metabólica

CONFIDENCIAL

178. Al afectar n estudio que relaciona la frecuencia de un determinada problema de salud de una población general con sus exposiciones global a un factor de riesgo. ¿Cuál es el estudio epidemiológico que se debe realizar?

a) Analítico

b) Correlacional

c) Descriptivo

d) Transversal

179. En la sala de alojamiento conjunto: usted como profesional de enfermería debe monitorear a un recién nacido a término, durante el periodo de la transacción (corresponde al cambio de vida intrauterina a extrauterina) este periodo produce en las primeras 4 a 6 horas después del nacimiento, durante estas etapas los recién nacidos deben ser monitoreado cada 60 minutos dantes las primeras horas de vida. Durante el periodo transicional. ¿Qué parámetro para el monitoreo puede disminuir en algunos recién nacidos a término durante el sueño?

a) Frecuencia respiratoria

b) Tono

c) Frecuencia cardiaca

d) Saturación de oxigeno

180. Hombre de 40 años acude a emergencia por presentar palpitaciones, debilidad, dolor, presión de pecho, fatigas y mareos. Al realizar un electro cardiograma se indica una fibrilación ventricular para el maneo le piden administrar una dosis inicial anti arrítmico ¿Cuál es el medicamento que permite a este grupo farmacológico?

a) Amiodarona

b) Atropina

c) Noraadrenalina

d) Dopamina

181. ¿En qué etapa del proceso de enfermería se organizan, analizan, sintetizan, y resumen los datos recogidos?

a) Valoración

b) Evaluación

c) Planeación

CONFIDENCIAL

d) Diagnóstico

182. Paciente con una trasfunción de concentrado de glóbulos rojos 0 negativo ¿Qué soluciones intravenosa puede administrar conjuntamente con el concentrado de glóbulos rojos descritos?

a) Plasma grupo O positivo.

b) Solución salina al 0.9 %.

c) Dextrosa al 5%

d) Lactato de Ringer

183. En un paciente con infarto de miocardio no complicado. Relaciones las intervenciones e enfermería con el fundamento que corresponde:

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA	FUNDAMENTO
1. Mantener al paciente en reposo en cama, con la cabeza elevada	a) Aumenta su provisión al miocardio
2. Administración de oxígeno según perenciones	b) Reduce el consumo de 02 al miocardio
3. Valoración de la disminución del volumen urinario	c) Reduce la precarga y postcarga los bronquiolos
4. Administración de morfina según perenciones	d) Es útil para identificar gasto cardiaco bajo

a) 1b, 2a, 3d, 4c

b) 1d, 2c, 3b, 4a

c) 1a, 2b, 3c, 4d

d) 1c, 2d, 3a, 4b

184. Como profesional de enfermería usted debe realizar una prueba cutánea de tuberculina a un paciente que se sospecha está infectado con el bacilo de tuberculosis ¿Qué sitio usted elige para realizar esta prueba?

a) **Parte interna del antebrazo**

b) Región periumbilical

c) Parte superior del tórax

d) Región supraescapular

CONFIDENCIAL

185. Como profesional de enfermería usted debe realizar valorar a un niño de 6 meses de edad, en la valoración física lo hace acostado con muslos en ángulo recto se aprecia altura distinta de las rodillas. ¿Qué Signos descarta en la valoración al niño?

a) Signo de Ortolani positivo

b) Signo de Barlow positivo

c) Limitación de la abducción

d) Signo de Galeazzi

186. Paciente acude al hospital por presentar irritabilidad moscas oral secas nauseas que llegan al vómitos por ocasiones. Se solicitan examen de laboratorio donde se idéntica Sodio de 150mEq/L para el tratamiento lapiden administrar una solución salina Hipotónica ¿Cuál es la solución que se debe preparar?

a) Solución de Dextrosa al 10%

b) Solución de Lactato de Ringer

c) Solución salina al 0.9%.

d) Solución salina al 0.3%

187. Relaciones los efectos neurológicos de accidente cerebro vascular con las intervenciones de enfermería que corresponde:

EFECTO NEUROLÓGICO	INTERVENCIONES
1. Hemiplejia	**a) Proveer un aparato de apoyo**
	b) Mantener el cuerpo alienado
	c) Colocar implemento para indicar
2. Ataxia	**d) Instruir al paciente para caminar**

a) 1cd, 2ab

b) 1ac, 2bd

c) 1ab, 2cd

d) 1bc, 2ad

CONFIDENCIAL

188. Varias enfermera han propuestos teorías que define y diferencia a la enfermería a otros profesionales ¿Cuál es la definición de enfermería de Dorotea Orem?

a) La función propia de la Enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación.

b) Lo fundamental de la enfermería es situar al paciente en el mejor estado posible para que la naturaleza actué sobre sí mismo

c) La Enfermería es un servicio al individuo y la familia

d) La Enfermería es el arte de actuar por la persona incapacitada, ayudarla a actuar por sí misma o ayudarla a aprender a actuar por sí misma.

189. Relaciones los mecamente antihipertensivos con las acciones que corresponda:

MEDICAMENTOS	ACCIONES PRINCIPAL
1. Losartan	**a) Inhibe en los iones de calcio**
2. Anlodipino	**b) Bloquea los efectos de la angiotensina II**
3. Hidralasina	**c) Diurético de asa perdida de volumen**
4. Furosemida	**d) Disminuye la resistencia peritetico vasodilatadores**

a) 1d, 2c, 3b, 4a

b) 1c, 2d, 3a, 4b

c) 1b, 2a, 3d, 4c

d) 1a, 2b, 3c, 4d

190. ¿Cuál es el cambio físico y funcional y relacionado con el envejecimiento?

a) Aumento de la densidad ósea

b) Disminución del tono muscular

c) Aumento del gasto cardiaco

d) Vaclamiento gástrico acelerado

191. Durante una entrevista de tamizaje para reconocer posible indicio de violencias de género, el profesional de salud expresa lo siguiente a su paciente: "le recomienda que se divorcie o mejor se valla a su casa" ¿en qué aspecto fallo el profesional de salud durante s entrevista?

a) Violando la confidencialidad de su paciente

b) Trivializando y minimizando el abuso

c) No respetando la autonomía del paciente

CONFIDENCIAL

d) Normalizando la violencia domestica

192. Paciente de 35 años tiene Rh negativo y ha dado a una niña con Rh positivo, por lo que está prescrito la administración de inmonogluvina anti Rh ¿Cuáles son las precauciones a seguir en la administración de este medicamento?

a) Las mismas que para cualquier fármaco por vía venosa

b) Utilizar siempre la vía venosa y administrar a la mamá

c) Administrar a la mama al bebe por ser niña

d) La misma que para trasfundir sangre

193. Relaciones las disfunciones neurológicas que se observan en paciente con accidente vascular cerebral con el cuidado de enfermería que corresponde:

DEFUNCIONES NEUROLÓGICAS EN PACIENTE CON ACCIDENTE VALARES CEREBRALES	CUIDADO DE ENFERMERÍA
1. Hemiplejia	a)Proveer al paciente de alternativas para comunicarse
2. disartria	b)Mantener el cuerpo alineado a una posición funcional
3. Ataxia	c)Colocar los objetos de cuidado personal en una misma localización
4. Diplopía	d)Instruir al paciente para no camine sin asistencia

a) 1b, 2a, 3d, 4c

b) 1d, 2c, 3b, 4a

c) 1a, 2b, 3c, 4d

d) 1c, 2d, 3a, 4b

194. Como profesional de enfermería usted va a difundir a los usuarios una clara sobre, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el centro de salud en el que trabaja; usted le informa sobre el enfoque que le permite al ser humano desarrollarse en todas las etapas de vida ¿a qué nos estamos refiriendo en lo descrito?

a) Enfoque de igualdad

b) Enfoque de sexualidad integral

c) Enfoque de inclusión social

d) Enfoque de interculturalidad

CONFIDENCIAL

195. Selecciones las necedades básicas de salud descrita por Virginia Henderson, utilizando la valoración de enfermería

1. Eliminación de desechos del organismo

2. Sexualidad Reproducción

3. Participar en actividades recreativas

4. Valores y Creencias

5. Tolerancia al estrés

6. Evitar los peligros del entorno

a) 2, 5, 6

b) 1, 3, 4

c) 1, 3, 6

d) 2, 4, 5

196. A la visita domiciliara usted se encentra con una familia de bajas recurso; la mama refiere que sus hijo solo comen dos vez por día, a la valoración de enfermería usted ve un grado de emaciación o delgadez por pérdida reciente de peso. ¿según el caso se está refiriendo a:?

a) Bajo peso

b) Desnutrición aguda moderada

c) Desnutrición aguda severa

d) Insuficiencias de micronutrientes

197. Relacione los factores de riesgo con las observaciones realizadas a la familia en la visita domiciliaria:

FACTORES DE RIESGO	OBSERVACIONES DE LA VISITA
1. Riesgo biológico	**a) Enfermedad diarreica**
	b) Madre soltera
	c) Embarazo no deseado
2. Riesgo Socio-económico	**d) Rechazo a la lactancia**

a) 1cd, 2ab

b) 1ac, 2bd

c) 1ad, 2bc

d) 1bc, 2ad

CONFIDENCIAL

198. ¿Cuál es la acción inmediata para eliminar la obstrucción de una sonda nasogástricas para alimentación?

a) Introducir una sonda Metálica

b) Reemplazar la sonda obstruida

c) Infundir agua tibia con presión suave

d) Infundir bebidas carbonatadas

199. ¿Cuál de las manifestaciones clínicas es signo de cáncer mamario avanzado?

a) Dolor mamario difuso

b) Retracción del pezón

c) Sensibilidad con la menstruación

d) Lesión móvil

200. En una unidad operativa las coberturas del tamizaje del Papanicolaou (PAP) se han mantenido con coberturas bajas durante los 2 últimos años. Al levantar información la edad de las mujeres que no han realzado el tamizaje corresponde a un rango de 25 a 35 años con una desviación estándar de 5,00 ¿Cuál es la interpretación del valor 5,00?

a) La edad de las mujeres que no se realizan el PAP están en el rango desde los 20 años a los 40 años.

b) La edad de las mujeres que no se realizan el PAP están en el rango desde los 25 años a los 30 años

c) La edad de las mujeres que no se realizan el PAP están en el rango desde los 30 años a los 50 años

d) La edad de las mujeres que no se realizan el PAP están en el rango desde los 20 años a los 45 años

201. Paciente de 9 años durante sus 5 días de hospitalización presenta fiebre. Al revisar el registro diario de la temperatura se observa un ascenso menor de 1c° en cada día. Este patrón de fiebre se conoce como:

a) Fiebre intermitente

b) Fiebre continúa

c) Fiebre recurrente

D) Fiebre remitente

CONFIDENCIAL

202. Paciente de 65 años que se encentra en el postoperatorio inmediato artropernia (sustitución) total de cadera. Relaciones las intervenciones de enfermería con el fundamento que corresponda

INTERVENNOS E ENFERMERA	ACCIONES
1. Mantener miembros inferiores en abducción	**a)Previene lesiones**
2. Valorar los pulsos palpítelo, pedio dorsal y tibial posterior	**b)Ayuda la circulación**
3. Colocar medias antiembolicas	**c)Para veritilzar la precion**
4. Mantener los talones sin presión	**d)Previene ulceras**

a) 1b, 2a, 3d, 4c

b) 1d, 2c, 3b, 4a

c) 1a, 2b, 3c, 4d

d) 1c, 2d, 3a, 4b

203. Relacione el tipo de dengue con las manifestaciones que correspondan

TIPO DE DENGUE	MANIFESTACIONES
1. Sin signos de alarma	**a. leucopenia**
	b. náuseas y vómitos
	c. sangrado de mucosas
2. con signos de alarma	**d. letargia irritabilidad**

a) 1cd, 2ab

b) 1ab, 2cd

c) 1ad, 2bc

d) 1bc, 2ad

204. Paciente que acude al servicio de emergencia con cuadro clínico de debilidad muscular y arritmia cardiacas, en el electrocardiograma presenta ondas T altas y picudas ensanchamientos del QRS. Teniendo en cuenta el cuadro descrito y los resultados de laboratorios: CA= 5mg/dl, NA=145 meq/l, K=4 meq/l ¿Qué trastorno electrolítico presenta el paciente?

a) Hipercalcemia

b) Hipocalcemia

c) Hipernatremia

d) Hipopotasemia

CONFIDENCIAL

205. Indique el trastorno hemorrágico que se caracteriza por la expulsión de sangre por la boca que precede de los procedentes del aparato respiratorio subglótico pulmonares u bronquios principales.

a) Hematemesis

b) Hemoptisis

c) Hemopatías

d) Hemodiálisis

206. Cuando el investigador informa al participante de los objetivos y el propósito de la investigación, el nivel de implicación que requiera la garantía de confidencialidad. El principio básico de la ética en investigación es:

a) Consentimiento

b) Honestidad

c) Lealtad

d) Veracidad

207. Desacuerdo a la guía de atención de labor de parto, parto y posparto, del Ministerio de salud pública del Ecuador, el parto es:

a) Una etapa en la que la mujer requiere de apoyo de los profesionales de salud, ya que su vida y la de su hijo está en riesgo

b) Un proceso de riesgo de vida para la madre y el niño/a, en que se recomienda tomar todas las medidas intervencionistas necesarias para evitar complicaciones

c) Un proceso fisiológico en que la madre e hijo saben que hacer, por lo tanto no es necesario el acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso

d) Un proceso fisiológico el cual debe ser respetado y en el que se deben ofrecer los estándares más altos de calidad de atención limitando a lo mínimo las intervenciones

208) ¿Cuál es cuidado correcto al descongelar la refrigeradora como partes de los procedimientos que asegura la adecuada conservación e las vacunas?

a) Descongelar la refrigeradora si el grosor del hielo en el evaporador es de 2,5 cm

b) Limpiar el equipo desinfectante suave o vinagre blanco, luego de lo cual se debe secar prolíferamente

c) Modificar la posición del termostato, incrementado la temperatura

d) Acelerar la congelación atizando objetos corto punzante para desprender las capas hielo

CONFIDENCIAL

209. Identifique las manifestaciones de la insuficiencia cardiaca izquierda aislada

a) Ascitis

b) Disnea

c) Hepatomegalia

d) Edema

210. Un paciente de 50 años sufre un paro cardiaco ¿Cuál es la relación correspondiente a la ventilación pulmonar aplica a este paciente durante un RCP, con dos reanimadores?

a) 15 compresiones y 2 ventilaciones

b) 30 compresiones y 2 ventilaciones

c) 10 compresiones y 3 ventilaciones

d) 40 compresiones y 4 ventilaciones

211. Cuál de las siguientes condiciones contribuyen a una causa preerrenal de la insuficiencia renal aguda

a) Hemorragia

b) Calculos

c) Glomerulonefritis

d) Pelonefrits

CONFIDENCIAL